องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ขอประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ด้วยสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในไทยยังคงพบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า และยังคงพบผู้ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงสำคัญ เมื่อถูกสุนัขหรือแมว กัด ข่วน และไม่เข้ารับการรักษา ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จึงทำให้ผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าเสียชีวิตในที่สุด

ดังนั้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าให้กับประชาชน อีกทั้งยังเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จึงขอความร่วมมือท่าน ดังนี้

๑. โรคพิษสุนัขบ้ามีอันตรายถึงชีวิต โดยผู้ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าจะเสียชีวิตเกือบทุกราย และสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปี เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มียาที่ใช้ในการรักษา แต่ป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน โดยสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้าน

๒. การปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากถูกสุนัขหรือแมว กัด ข่วน ให้ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดทันที เช็ดแผลด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และรีบไปพบแพทย์ทันทีพร้อมประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเข้ารับการรักษาที่ถูกต้อง

๓. หากพบว่าสุนัขหรือแมว กัด ข่วน ตนเองหรือผู้อื่น ให้นำสุนัขหรือแมวไปขังไว้ เพื่อสังเกต อาหารอย่างน้อย ๑๐ วัน หรือพบสัตว์สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้าต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัด เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดทันที

โรคพิษสุนัขบ้า



เกิดจากเชื้อ เรบีส์ไวรัส (Rabies Virus)
มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น สุนัข แมว วัว ควาย ลิง หนู กระต่าย กระรอก ฯลฯ เป็นพาหะนำโรค

ผู้ติดเชื้อจนมีอาการ ตาย 100%

กลุ่มเสี่ยง

- อายุต่ำกว่า 15 ปี
- ถูกกัด ข่วน แล้วไม่ฉีดวัคซีน

การติดต่อ

ถูกสัตว์มีเชื้อ ☑ กัด ☑ ข่วน ☑ เลียบาดแผล

อาการผู้ป่วย



ดูอย่างไรว่าสัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้า

ระยะเริ่มแรก
- นิสัยเปลี่ยน ไม่ร่าเริง
- หงุดหงิด เก็บตัว
- หวาดระแวง ป่านตายขายาย

ระยะตื่นเต้น
- กระวนกระวาย
- กัดไม่เลือก
- เห่าหอน

ระยะอัมพาต
- น้ำลายไหล
- คางห้อยตก
- ล้มลง ตาย

คำแนะนำเมื่อถูกกัด-ข่วน-เลีย



ล้างแผล
ด้วยสบู่และน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง



ใส่ยา
เบตาดีน



กักหมา-แมว
เพื่อสังเกตอาการ 10 วัน



หาหมอ
หากฉีดวัคซีนต้องมาตามนัดทุกครั้ง

คำแนะนำสำหรับผู้เลี้ยง



ฉีดวัคซีน
โรคพิษสุนัขบ้าทุกปี



เลี้ยงในรั้วบ้าน
ออกนอกบ้านต้อง ใส่สายจูง



ฝึกให้ เชื่อฟังคำสั่ง



ทำหมัน คุมกำเนิด

คาถา 5ย. กันสุนัขกัด

- ย1 อย่าแหย่ — ทำให้สุนัขโกรธ
- ย2 อย่าเหยียบ — หาง หัว ตัว ขา ให้สุนัขตกใจ
- ย3 อย่าแยก — สุนัขที่กัดกันด้วยเมื่อเปล่า
- ย4 อย่าหยิบ — อาหารที่สุนัขกำลังกิน
- ย5 อย่ายุ่ง — กับสุนัขที่ไม่รู้จักหรือไม่มีเจ้าของ

ทำอย่างไร! เมื่อสัตว์เลี้ยงโดนหมาบ้ากัด



ล้าง ทำความสะอาดบาดแผลให้สัตว์เลี้ยง
...ล้างแผลด้วยน้ำสบู่หลายๆครั้ง จากนั้นใส่ยาฆ่าเชื้อ



รีบ พาสัตว์เลี้ยงไปพบสัตวแพทย์
...เพื่อรับการรักษาและฉีดวัคซีนตามคำแนะนำของสัตวแพทย์



กักสัตว์เลี้ยงไว้ดูอาการ อย่างน้อย 6 เดือน
...ให้อาหารและน้ำตามปกติ
...หากสัตว์ตาย ให้เรียกปศุสัตว์เก็บตัวอย่างส่งตรวจโรคพิษสุนัขบ้า



www.dld.go.th

ที่มา
สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์

จัดทำโดย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์

โรคพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิด!!!



9.แสดงอาการทางประสาท และ
เสียชีวิตในที่สุด



1.เชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้า
หรือเรบี่ส์ไวรัส

2.เมื่อถูกสัตว์ที่
มีเชื้อพิษสุนัข
บ้ากัด



3.เชื้อเข้าสู่
บาดแผลผ่าน
ทางน้ำลายของ
สัตว์ที่มีเชื้อ



4.ไวรัสพิษสุนัขบ้าจะ
เพิ่มจำนวนบริเวณ
กล้ามเนื้อที่อยู่ใกล้
บริเวณบาดแผลอย่าง
รวดเร็ว



5.หลังจากนั้นเชื้อจะเข้าสู่เซลล์
ประสาทในระบบประสาทส่วนปลาย

6.ซึ่งไวรัสสามารถเดินทางในส่วนนี้ด้วยอัตราเร็วเฉลี่ย
มากสุด 8 ซม./วัน ผ่านตัวรับ p75NTR



8.แล้วเชื้อก็จะเข้าสู่
ต่อมน้ำลาย ทำให้แพร่
เชื้อผ่านทางน้ำลาย



7.จนกระทั่งเข้าสู่ระบบ
ประสาทส่วนกลางที่สมอง
เกิดการทำลายเซลล์สมอง

จัดทำโดย กลุ่มควบคุมป้องกันโรคสัตว์เลี้ยง
สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สแกนคิวอาร์โค้ดความรู้โรคพิษสุนัขบ้า
และแจ้งโรคได้ที่ศูนย์เฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า
โทร : 063-225-6888

สื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า หมายเลข A1